



सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का एवं बीज उत्पादन तकनीकी



मक्का अनुसंधान निदेशालय

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

पुसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012 (भारत)

वेबसाइट: www.maizeindia.org

सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का एवं बीज उत्पादन तकनीकी

वी.के. यादव, साईं दास,
एम.एल. जाट एवं योगेन्द्र यादव



मक्का अनुसंधान निदेशालय

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 (भारत)

ई मेल : pdmaize@gmail.com

वेबसाईट : www.maizeindia.org, <http://expert.iasri.res.in/agridaksh>

फोन : 011-25841805, 25842372

फैक्स : 011-25848195

करेक्ट साइटेशन:

वी. के. यादव, साईं दास, एम. एल. जाट एवं योगेन्द्र यादव (२०१२). सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का एवं बीज उत्पादन तकनीकी | डी. एम. आर. तकनीकी बुलेटिन २०१२/ २. मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या २४.

© मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली

२०१२ में प्रकाशित

प्रकाशित

परियोजना निदेशक

मक्का अनुसंधान निदेशालय,

पूसा परिसर, नई दिल्ली - 110012

विषय सूची

क्र०स०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बातें	4
3.	सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बीज उत्पादन तकनीकी	5
4.	तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन	13
5.	सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बीज उत्पादन का आर्थिक विश्लेषण	14

सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का एवं बीज उत्पादन तकनीकी

परिचय

विश्व में मक्का एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में जाना जाता है। यह 150 से अधिक देशों में उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस और भारत प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं। भारत में धान एवं गेहूँ के बाद मक्का सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। अपने देश में सन् 2010-11 में 85.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का उगाया गया जिससे 217.3 लाख टन पैदावार प्राप्त हुई और औसत उत्पादकता 25.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर (चित्र 1) दर्ज की गई।


भारत में मक्का के जीनोटाइप के विकास की तकनीक के साथ-साथ क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता परिदृश्य

अवधि	मक्का के प्रजनन तकनीके
1950-60	लैंड रेसेज
1960-67	डबल क्रॉस (डी.सी.)
1967-71	संकुल
1971-89	संकुल एवं डबल टाप क्रॉस (डी.टी.सी) / डी.सी
1989-2000	सिंगल क्रॉस हाइब्रिड (एस.सी.एच) / डी.सी/ श्री वे क्रॉस एवं संकुल
2000-06	एस.सी.एच/ श्री वे क्रॉस / डी.सी एवं संकुल
2006-आगे	सिंगल क्रॉस हाइब्रिड



वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हे.)	उत्पादन (लाख टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	सिंचित क्षेत्रफल (%)
1950-51	31.6	17.3	547	11.4
1960-61	44.1	40.8	926	12.6
1970-71	58.5	74.9	1279	15.9
Increase (%) over 1950-51	85.13	332.95	133.82	39.5
1980-81	60.1	69.6	1159	20.1
1990-91	59.0	89.6	1518	19.7
Increase (%) over 1970-71	0.85	19.63	18.69	23.90
2000-01	66.1	120.04	1822	22.4
2005-06	75.9	147.1	1938	21.1
2006-07	78.9	151.0	1912	21.5
2007-08	81.2	189.6	2335	23.5
2008-09	81.7	197.3	2414	NA
2009-10	82.6	167.2	2024	NA
2010-11	85.5	217.3	2540	NA
Increase (%) over 2000-01	29.35	72.18	39.41	NA

*अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दिनांक 03.02.2012 को वर्ष 2010-11 के लिए आंकड़े का अंतिम अनुमान जारी किया गया।




चित्र 1. भारत में मक्का का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का ट्रेंड

मक्का के उन्नत किस्मों, उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकियों के विकास एवं प्रसार के लिए सन् 1957 में अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना का प्रादुर्भाव हुआ। इस

परियोजना के तहत सन् 1961 से अब तक 143 संकर (हाइब्रिड) किस्मों का विकास हुआ है। अब एकल क्रॉस संकर (सिंगल क्रॉस हाइब्रिड) किस्मों के विकास पर जोर दिया जा रहा है और सामान्य मक्का, क्वालिटी प्रोटीन मक्का एवं बेबी कॉर्न के 56 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किस्मों (अनुसुची) का विकास हुआ है। पिछले वर्ष (2009-10) की तुलना में सन् 2010-11 में मक्का के उत्पादन में 30 प्रतिशत तथा उत्पादकता में 25 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका श्रेय मुख्य रूप से सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का को जाता है जो अभी मक्का के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत भाग में फैला हुआ है।

आनुवंशिकी रूप से दो असमान इनब्रेड के क्रॉस (संगम) से प्राप्त प्रथम पीढ़ी (एफ 1) के पौधे को सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किस्म कहा जाता है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का के बीज उत्पादन के लिए एक नर और एक मादा इन्ब्रेड की जरूरत होती है और सिर्फ एक सीजन (ऋतु) में तैयार हो जाता है। इसका बीज उत्पादन, कुछ स्थान विशेष तकनीकियों को छोड़कर सभी जगह एक समान होता है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना (मक्का अनुसंधान निदेशालय) का केन्द्र सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है (मानचित्र 1)। बीज उत्पादक समीप के केन्द्र के मक्का प्रजनक से स्थान विशेष तकनीकियों की जानकारी एवं नर तथा मादा इन्ब्रेड की प्राप्ति हेतु सलाह ले सकते हैं।



मानचित्र 1. भारत में मक्का अनुसंधान का नेटवर्क

स्थान विशिष्ट बीज उत्पादन/बीज ग्राम की अवधारणा

सम्पूर्ण देश में उत्तम बीज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम को स्थान विशिष्ट बनाना चाहिए जिसमें 'बीज ग्राम' अवधारणा निम्न रूप में सहायक होगी :

- पृथक्करण (आइसोलेशन) की समस्या से छुटकारा
- निगरानी में आसान
- बीज की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना
- उत्पादन लागत में कमी
- बीज की समय पर उपलब्धता
- परिवहन लागत में कमी
- फार्म की लाभप्रदता में सुधार
- ग्रामीण व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन
- विदेशी मुद्रा का अर्जन, क्योंकि विकासशील तथा अर्ध विकसित देशों में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड (एससीएच) मक्का बीज उत्पादन की लागत सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता के कारण काफी कम है।

सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के लाभ

- किसानों के बीच अधिक पसंदीदा
- सिर्फ दो जनकों की आवश्यकता
- पृथक्करण (आइसोलेशन) की कम संख्या अर्थात् कुल तीन आइसोलेशन
- बीज को बढ़ाने (मल्टीप्लाय) में आसान और कम श्रमिकों की आवश्यकता
- कम उत्पादन लागत
- जैविक तथा अजैविक दबावों (स्ट्रेस) के प्रति सहिष्णु
- एकरूपता तथा उच्च उत्पादकता के कारण विपणन आसान
- कृषि स्नातकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के लिए उत्पादन के पहले की आवश्यकताएँ

- सही स्थान का चयन – ऐसे स्थान का चयन न करें जहाँ पूर्ववर्ती फसल भी मक्का रही हो

- उर्वर और अच्छी भूमि जिसमें सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो।
- उत्पादक, समरूपी तथा आनुवंशिकी रूप से असमान अंतःजात (इंब्रेड)
- उचित पृथक्करण दूरी
- संकर बीज उत्पादन तकनीकी (उत्पादन प्रक्रियाएं)
- तकनीकी रूप से कुशल कार्यकर्ता (मैनपावर)
- दबावमुक्त (स्ट्रेस फ्री) मौसम

अच्छे बीज जनक (मादा) के लक्षण

- उत्पादक
- मजबूत
- पूर्ण आयाम के साथ लंबे भुट्टे (चित्र 2)
- भुट्टों का नीचे की ओर स्थित होना
- लेक्स टेसल (शिथिल नरमंजरी)
- परागोद्भव सिल्किंग का कम अंतराल (शार्ट एंथिसिस सिल्किंग इंटरवल)
- पोषकों के प्रति सकारात्मक
- स्टे ग्रीन ट्रेट (हरे बने रहने का गुण)
- खड़ी/उर्ध्वाकार पत्तियाँ
- जैविक/अजैविक दबावों के प्रतिरोधी/सहिष्णु
- मजबूत जड़ तंत्र



चित्र 2. पूर्ण आयाम के साथ लम्बे भुट्टे

अच्छे पॉलेन जनक (नर) के लक्षण

- लेक्स टेसल, कुछ द्वितीयक शाखाओं सहित लंबी मुख्य शाखा (चित्र 3)
- पॉलेन गिरने की लंबी अवधि
- मादा जनक से अधिक लंबा
- आकर्षक रंग वाले दाने
- झुकाव (लाजिंग) के प्रति मजबूत प्रतिरोधिता तथा बेहतर जड़ तंत्र
- उच्च उपज क्षमता
- जैविक/अजैविक दबावों के प्रतिरोधी/सहिष्णु



चित्र 3. अच्छे पॉलेन (नर) जनक

हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बातें

पृथक्करण दूरी (आइशोलेशन डिस्टेंस)

जहां तक संभव हो आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए संकर बीज का उत्पादन या तो ऐसे क्षेत्र में करना चाहिए जहां बीज उगाये जाने वाले खेत के आसपास मक्के की कोई अन्य किस्म न उगाई जा रही हो या दो मक्का प्रतिरूपों (जीनोटाइप) के बीच कम से कम 400-500 मीटर की दूरी हो। इसे “बीज ग्राम अवधारणा” से संभव बनाया जा सकता है जिसके तहत एक गांव में केवल एक संकर बीज का उत्पादन किया जाए जो कि उत्तम बीज उत्पादन के लिए सबसे आसान तरीका है।

नर: मादा अनुपात

यह अनुपात निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:

- अ) नर जनक के पॉलेन गिरान की क्षमता तथा
- ब) नर:मादा समकालिकता (सिंक्रोनी) अच्छी बीज सेटिंग के लिए मादा पौधों में पुष्पन नर पौधों से पहले होना चाहिए या नर परागों का स्फुटन (डेहिसंस) मादा सिल्किंग के साथ होना चाहिए। सामान्यतः नर:मादा का अनुपात 1:2 (चित्र 4), 1:3 (चित्र 5) या 1:4 होना चाहिए।



चित्र 4. नर और मादा का अनुपात 1:2



चित्र 5. नर और मादा का अनुपात 1:3

नर और मादा अनुपात में समकालिकता (सिंक्रोनी) कैसे लाएं?

नर:मादा में समकालिकता (चित्र 6) लाने के लिए निम्न तरीके इस्तेमाल करने चाहिए।

- नर तथा मादा पौधों को टेढ़े-मेढ़े ढंग से लगाना चाहिए (स्टेगर्ड प्लांटिंग)



चित्र 6. नर एवं मादा का सिंक्रोनी

- पौधों को कहीं दूर तो कहीं पास लगाकर पौधों के बीच की दूरी में अंतर किया जा सकता है।
- सिंचाई के साथ खाद का अनुप्रयोग करना चाहिए।
- नर या मादा से किसी एक में अगेतीपन (अर्लीनेस) तथा ओज (विगर) प्रेरित करने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करके पुष्पन पहले कराया जा सकता है।

सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बीज उत्पादन तकनीकी

खेत का चयन

बीज उत्पादन कार्यक्रम को ऐसी जगह अपनाना चाहिए जहां भूमि में पानी निकास की व्यवस्था अच्छी हो, खरपतवारों और रोग मुक्त मिट्टी हो तथा प्राथमिकता ऐसे खेतों को देनी चाहिए जिसमें बीज उत्पादन से पूर्व मक्के की फसल न ली गई हो इससे आनुवंशिक शुद्धता के साथ साथ अनचाहे पौधों को कम किया जा सकता है।

बुवाई का समय

बुवाई के सही समय का ध्यान रखना फसल की अच्छी बढ़त के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत के अधिकतर भागों में

खरीफ के मौसम में जुलाई का प्रथम सप्ताह तथा रबी मौसम में नवम्बर का प्रथम सप्ताह बुवाई के लिए सर्वोत्तम समय है क्योंकि इससे खरीफ में भारी वर्षा से तथा ठंडे में कम तापमान या पाला से पुष्पण अवस्था को बचाया जा सकता है। अच्छे पोलिनेशन (परागण) के लिए वर्षा तथा कम तापमान को पुष्पण अवस्था के साथ साथ नहीं घटित होना चाहिए। खरीफ में पुष्पन के दौरान वर्षा से परागकण धुल जाते हैं तो वहीं ठंडी के मौसम में कम तापमान के कारण पौधे मर जाते हैं या परागकोश (एंथर) जीवित नहीं रह पाते।

बुवाई की विधि

बीज को मेड़ों (रिजेज) पर बोना चाहिए (चित्र 7)। बुवाई, पूर्वी-पश्चिमी रिजों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए इससे अच्छा अंकुरण होता है। बुवाई के समय बीज में उचित दूरी (चित्र 8 एवं 9) बनाए रखनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी क्रमशः 60 तथा 20 से.मी. रखना चाहिए। उपयुक्त दूरी को बनाए रखने से अनवाँछित पौधे तथा नर मंजरी (टेसल) को हटाने हेतु खेत में आना जाना आसान होता है। उचित दूरी बनाए रखने से टेस्ट भार को सुधारने में भी मदद मिलती है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बीज उत्पादन में नर एवं मादा जनको की जरूरत पड़ती हैं। बुवाई के समय सावधानी रखनी चाहिए कि दोनों बीज आपस में न मिलें। अलग-अलग पंक्तियों में नर एवं मादा अनुपात के अनुसार जनकों की बुवाई करनी चाहिए। नर तथा मादा पंक्तियों में अंतर के लिए पहचान लेबल/टैग (चित्र 10) लगाया जाना चाहिए। इससे बाद में किए जाने वाले सभी कार्यों में सुविधा रहती है।



चित्र 7. मेड़ (रिज) एवं नाली (फरों)



चित्र 8. उचित दूरी पर बीज को रखना



चित्र 9. बीज को मिट्टी से ढकना



चित्र 10. नर पंक्तियों में पहचान लेबल

बीज दर

बीज दर निम्न बातों पर निर्भर करती है:

- अ) बीज का आकार/नर और मादा बीजों का टेस्ट भार,
- ब) पौधे का प्रकार: सीधे/उठे हुए पौधों के लिए अधिक बीज दर की आवश्यकता होती है तथा फैलाव लिए हुए पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम, क्योंकि सीधे/उठे रहने वाले पौधे में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पौधे आते हैं।
- स) नर-मादा अनुपात: सामान्यतः उपयुक्त बीज दर मादा पौधों के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा नर पौधों के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा बीज का न्यूनतम जमाव 80 प्रतिशत होनी चाहिए।
- द) ऋतु : सामान्यतः खरीफ की अपेक्षा रबी में पादप संख्या या बीज दर अधिक होती है।

बीज उपचार

बीज को बीज तथा मृदा जनित रोगों एवं कीट-व्याधियों से बचाने के लिए, बुवाई से पहले कवकनाशियों तथा कीटनाशियों से उपचारित करना चाहिए। (चित्र 11, 12 एवं 13)




चित्र 11. बीज में दवा डालना

- टीएलबी, बीएसएलबी, एमएलबी आदि के लिए बावेस्टिन + केप्टान 1:1 के अनुपात में
- बीएसएमडी के लिए अपरॉन 35 एसडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से



चित्र 12. बीज और दवा को मिलाना



चित्र 13. बीज को छाया में सुखाना

- पिथियम वृत्त सड़न के लिए कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम को दर से
- प्ररोह मक्खी (शूट-फ्लाई) के लिए इमिडाक्लोप्रिड 6 मि. ली./कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

पोषण प्रबंधन

सामान्यतः, अंतःजात (इन्ब्रेड) पौधे धीमी गति से वृद्धि करते हैं तथा स्वभावतः कमजोर होने के साथ साथ इनकी पोषण ग्रहण क्षमता भी कमजोर होती है। अतः हाइब्रिड (संकरों) की तुलना में अंतःजात को अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। बिजाई के 15 दिन पूर्व प्रति हेक्टेयर 15 टन गोबर की खाद का प्रयोग वांछित होता है। अंतःजात पौधों के लिए प्रति हेक्टेयर 180-200 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम

फॉस्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश तथा 25 किलोग्राम जिंकसल्फेट की आवश्यकता होती है।

फॉस्फोरस, पोटाश ओर जिंक की पूरी खुराक तथा 10 प्रतिशत नाइट्रोजन को बुवाई के समय देना चाहिए (चित्र 14)। नाइट्रोजन के शेष डोज (खुराक) को चार हिस्सों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार देना चाहिए, ताकि नुकसान से बचने के साथ-साथ पूरे फसल चक्र के दौरान फसल की उर्वरक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

- 20 प्रतिशत 4 पत्ती की अवस्था में
- 30 प्रतिशत 8 पत्ती की अवस्था में (चित्र 15)
- 30 प्रतिशत नाइट्रोजन पुष्पन अवस्था में
- 10 प्रतिशत नाइट्रोजन दाना भरने की अवस्था में



चित्र 14. बुवाई के पहले उर्वरक का प्रयोग



चित्र 15. आठ पत्ती की अवस्था में यूरिया का प्रयोग

जल प्रबंधन

पहली सिंचाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए। पानी को मेड़ों (रिजेज) के ऊपर से नहीं बहने देना चाहिए। सिंचाई को नालियों में मेड़ों के दो तिहाई ऊँचाई (चित्र 16) तक ही देना चाहिए। वर्षा तथा मृदा की नमी को रोकने की क्षमता को देखते हुए, फसल की मांग के अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। इन्ब्रेड जनकों के लिए हल्की और बार बार सिंचाई की जरूरत होती है। यंग सिडलिंग, घुटनों तक की ऊँचाई (चित्र 17), पुष्पन और दाना भरने का समय तथा दाना भरने के 10 दिन बाद की अवस्था सिंचाई की दृष्टि से इन्ब्रेड पौधों के लिए संवेदनशील होता है। अतः इन अवस्थाओं में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।



चित्र 16. फरों में सिंचाई



चित्र 17. घुटने भर की अवस्था में सिंचाई

खर-पतवार प्रबंधन

विशेष रूप से आर्द्र (मानसून) मौसम में मक्का की फसल में खरपतवारों की गंभीर समस्या रहती है। ये खरपतवार मक्के के लिए उपलब्ध पोषकों का खुद दोहन करके लगभग 35 प्रतिशत तक उपज में कमी कर देते हैं। इसलिए अधिक उपज लेने के लिए इन खरपतवारों का समय पर प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अट्राजीन एक चयनित और ब्रॉड स्प्रेक्ट्रम खरपतवारनाशी होने के कारण चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के साथ-साथ अन्य प्रमुख घासों को नियंत्रित करता है। बुवाई के बाद और खरपतवार के निकलने के पूर्व 600 लीटर पानी में 1.0 से 1.5 कि.ग्रा. अट्राजीन घोलकर छिड़काव करना चाहिए (चित्र 18)। समय की बचत तथा पूरे खेत को कवर करने के लिए



चित्र 18. अट्राजीन का छिड़काव



चित्र 19. पीछे खिसकते हुए निड़ाई-गुड़ाई करना

तीन नॉजल बूम का उपयोग अच्छा होता है। मिट्टी में वायु प्रवाह बनाए रखने तथा शेष खरपतवारों को उखाड़ने के लिए एक से दो निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। निराई-गुड़ाई करते समय किसान को पीछे की ओर खिसकना चाहिए (चित्र 19) ताकि मिट्टी पर दबाव न पड़े, भुर-भुर रहे और इसमें अच्छा वायु प्रवाह बना रहे।

कीट प्रबंधन

मक्का में तना भेदक (चित्र 20 एवं 21) एक गंभीर समस्या है। बीज जमने के 10 दिन पश्चात् 2.5 ग्राम कार्बेरिल (85% वेटेवेल पाउडर) प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से तना भेदक की रोकथाम की जा सकती है। छिड़काव पौधे के गोभ (केन्द्रीय भाग) में करना चाहिए। (चित्र 22)



चित्र 20. वयस्क तना भेदक



चित्र 21. तना भेदक का लार्वा



चित्र 22. पौधों के गोभ में कीटनाशक का छिड़काव

रोग प्रबंधन

फसल में रोगों के लगने से उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मक्का में लगने वाले प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन निम्नलिखित है:

1. **टर्सीकम लीफ ब्लाइट** (चित्र 23): 8-10 दिनों की अन्तराल पर जिनेब/ मानेब का 2 ग्रा./ लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए।



चित्र 23. टर्सीकम लीफ ब्लाइट

2. **मेडिस लीफ ब्लाइट** (चित्र 24): डाईथेन एम-45 का 2 ग्रा./ लीटर पानी की दर से 2-4 बार छिड़काव करना चाहिए।



चित्र 24. मेडिस लीफ ब्लाइट

3. **पोलीसोरा रस्ट** (चित्र 25): रोग की पहचान होने के बाद



चित्र 25. पोलीसोरा रस्ट

डाईथेन एम-45 का 2 ग्रा./ लीटर पानी की दर से 15 दिन के अन्तराल पर तीन बार छिड़काव करना चाहिए।

4. **बैंडेड लीफ एंव शीथ ब्लाइट** (चित्र 26): पौधे के निचले भाग के 2-3 पत्तों को शीथ सहित निकाल कर फेंक देना चाहिए तथा पीट आधारित स्ट्रुडोमोनास फ्लोरीसेंस संयोजन 16 ग्रा./ कि. ग्रा. बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए या राइजोलैक्स 50 डब्ल्यू पी 10 ग्रा./ 10 लीटर पानी की दर से पर्णीय छिड़काव करना चाहिए।



चित्र 26. बैंडेड लीफ एंव शीथ ब्लाइट



चित्र 27. सोरघम डाउनी मिल्ड्यू

5. **सोरघम डाउनी मिल्ड्यू** (चित्र 27): संक्रमित फसल के कचरे और अनचाहे ज्वार (खरपतवार) को नष्ट किया जाना चाहिए तथा सिस्टेमिक फुंफुदनाशी जैसे-मेटालैक्सिल (ऐपरोन 35 डब्ल्यू पी) 2.5 ग्रा./कि.ग्रा. बीज की दर से बीज उपचारित करना चाहिए।

अवांछनीय पौधों को निकालना (रोगिंग) तथा पौध सघनता को कम करना (थिनिंग)

अवांछनीय पौधें जैसे भिन्न पौधें, रोगग्रस्त पौधें, अतिरिक्त पौधें इत्यादि को कम से कम तीन बार निकालना जरूरी होता है।

1. शुरूआती दौर में अर्थात् बुवाई के 12-15 दिन पश्चात अलग से दिखने वाले पौधों तथा एक साथ लगे कई पौधों को हटा देना चाहिए तथा एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 20-25 से.मी. दूरी रखी जानी चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को वृद्धि एवं विकास के समान अवसर मिल सकें (चित्र 28, 29, 30 एवं 31)।



चित्र 28. असमान पौधों को पहचानना



चित्र 29. असमान पौधों को पैर से दबाते हुए



चित्र 30. टूटे हुए पौधों को उखाड़ना



चित्र 31. असमान पौधों को खेत से बाहर निकालना

2. पौधे के घुटने तक की ऊँचाई की अवस्था में तथा
3. जब फूल निकल रहे हों अर्थात् एंथीसिस अवस्था से पहले।

नर तथा मादा लाइन से असमान पौधों को हटा देना चाहिए ताकि बीज की आनुवंशिक शुद्धता बनाई रखी जा सके। असमान टेसल (नरमंजरी) वाले नर पौधों को पराग झड़ने से पहले अवश्य हटा देना चाहिए।

मिट्टी चढ़ाना (अरदिंग अप)

मिट्टी चढ़ाने से एक दिन पहले, नाइट्रोजन की तीसरी खुराक डालनी चाहिए तथा इसके पश्चात निराई गुड़ाई (होइंग) करना चाहिए। अगले दिन मिट्टी चढ़ाने का कार्य (चित्र 32) पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा निड़ाई गुड़ाई करते समय हमेशा पीछे की दिशा में बढ़ना चाहिए। इस क्रिया को नरमंजरी निकलने की अवस्था (टेसलिंग स्टेज) से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए ताकि फसल को झुकने (लाजिंग) से बचाया जा सके।



चित्र 32. मिट्टी चढ़ना

नरमंजरी निकालना (डि-टेसलिंग)

हाइब्रिड बीज बनने के लिए नर जनक के पराग (पोलेन) द्वारा मादा जनक के सिल्क का परागित होना जरूरी है। यदि मादा जनक पौधों की टेसल से निकला पराग उसी जनक पौधों के सिल्क को परागित करता है तो हाइब्रिड बीज नहीं बनता है। अतः खेत में दो जनकों में से मादा जनक की टेसल निकाल देना आवश्यक है तभी उस पौधे का सिल्क दूसरे के पराग से परागित होगा और हाइब्रिड बीज बनेगा। जब टेसल मादा पौधों के पर्णच्छेद से बिल्कुल बाहर निकल आती है, परन्तु परागकोष से पराग झरना (एंथेसिस) प्रारम्भ नहीं हुआ होता, उस समय टेसल निकालने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। टेसल निकालने के लिए पौधे के तने को टेसल के थोड़ा नीचे बाएँ हाथ से पकड़े और पूरी टेसल को दाहिने हाथ से मजबूती से पकड़े और ऊपर की ओर



चित्र 33. नर मंजरी (टेसल) निकालना

स्थिरतापूर्वक खींचे तथा पंक्तियों के बीच जमीन पर रखें। इसे पंक्तिवार करना चाहिए। एक आदमी को प्रत्येक पंक्ति में जाकर पता लगाना चाहिए कि नर मंजरी का कोई भी भाग अंदर न रह गया हो। डिटेसलिंग की यह प्रक्रिया 8-10 दिनों तक जारी रहनी चाहिए। डिटेसलिंग के दौरान टेसल के साथ पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए (चित्र 33) अन्यथा इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कमी हो सकती है। यह देखा गया है कि टेसल के साथ 1 से 3 पत्तियां हटाने से उपज में 5 से 15 प्रतिशत तक की कमी होती है। हटाए गए टेसलों को एकत्रित करके पशुओं के पोषक चारे के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

भुट्टों की तुड़ाई

मादा की अपेक्षा नर जनकों के भुट्टों की तुड़ाई पहले की जानी चाहिए और इन्हें अलग रखना चाहिए। नर जनक के भुट्टों से मक्का का दाना और मादा जनक के भुट्टों से हाइब्रिड बीज प्राप्त होता है। तुड़ाई के समय दानों में लगभग 20 प्रतिशत नमी होना चाहिए। तोड़े गए भुट्टे को इक्छा रखने के बजाय फैला देना चाहिए।

फसल निरीक्षण की विभिन्न अवस्थाएं

- बुवाई के समय : भूमि की जांच, पृथक्करण दूरी, नर:मादा का अनुपात, उपयुक्त बुवाई का समय, बीजोपचार, इत्यादि को देखने हेतु।
- फूल आने से पहले/कार्यिक अवस्था : अवांछित पौधों की परख तथा उनको हटाने के लिए (चित्र 34 एवं 35)



चित्र 34. बुवाई के बाद फसल का निरीक्षण



चित्र 35. फूल आने से पहले फसल का निरीक्षण

- फूल आने की अवस्था : रोग तथा कीट के प्रकोपों की परख हेतु।
- फूल आने के बाद तथा तुड़ाई पूर्व अवस्था : मृत तथा रोगग्रस्त पौधों को हटाने के लिए।
- तुड़ाई के समय: तुड़ाई के उपयुक्त समय की परख के लिए।

तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन

बीज जनक भुट्टों को सुखाना एवं छांटना

सूर्य के रोशनी में भुट्टों को सुखाना सबसे सस्ता तरीका है। बीज को किसी प्रकार की चोट से बचाने के लिए भुट्टों को सुखाने का कार्य कच्चे या पक्के फर्श पर न करके इन्हें त्रिपाल (टारपोलीन शीट) पर करना चाहिए तथा रात में इन्हें ढककर रखना चाहिए। बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए असमान, रोगग्रस्त तथा कीटग्रस्त भुट्टों को दाने निकालने (शेलिंग) के पूर्व हटा देना चाहिए। मादा भुट्टों को 13-14 प्रतिशत आर्द्रता तक सुखाने के बाद एक बार फिर छंटाई करना चाहिए और उसके बाद शेलिंग करना चाहिए।

शेलिंग

किसी प्रकार के यांत्रिक मिलावट से बचने के लिए नर की बजाय मादा जनकों (पैरेंट) की शेलिंग का कार्य पहले किया जाना चाहिए। इसे मानव द्वारा या बिजली चालित मेज शेलर द्वारा किया जा सकता है। बीज में अधिक नमी रहने पर शेलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बीज तथा भ्रूण को चोट पहुँचने का खतरा रहता है। भण्डारण के समय भी काफी नुकसान हो सकता है।

बीज प्रसंस्करण

बीज को अच्छी तरह से सुखा लेने के पश्चात ही प्रसंस्करण करना चाहिए। बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी छोटे, टूटे हुए तथा क्षतिग्रस्त बीजों को हटा देना चाहिए। यह बीज प्रसंस्करण इकाई (चित्र 36 से 39) में भी किया जा सकता है।



चित्र 36. बीज प्रसंस्करण इकाई



चित्र 37. मोबाईल बीज प्रसंस्करण इकाई



चित्र 38. फीड हॉपर



चित्र 39. बीज ग्रेडर

भंडारण तथा विपणन

बीजों को सुखाने का कार्य तब तक जारी रखना चाहिए जब तक की बीज में नमी का अंश 8 प्रतिशत तक न हो जाए। इसके बाद बीज को एयरटाइट जूट के बोरे में रखना चाहिए। बीजों को ठंडे व शुष्क स्थान पर भंडारित करना चाहिए तथा कोल्ड स्टोरेज को प्राथमिकता देनी चाहिए। खराब भंडारण के स्थिति में दानों में शक्ति (विगर) की कमी तथा कम अंकुरण की संभावनाएं रहती हैं। मानकों तथा अन्य निर्धारण (चित्र 40) के अनुसार इन्हें बेचा जाना चाहिए।




चित्र 40. मानक के साथ बीज का बैग

सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बीज उत्पादन का आर्थिक विश्लेषण

बीज उत्पादन की आर्थिक पहल (अ) उत्पादकता (ब) आनुवांशिक शुद्धता (स) प्रभावी बीज उत्पादन तकनीकी तथा (द) प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। भारत में एकल संकर मक्के के बीज उत्पादन का आर्थिक विश्लेषण इस प्रकार है।

खेती की प्रक्रियाएं	राशि रु०/ हेक्टेयर
1. खेत तैयार करना तथा बुवाई (हैरोइंग, टिलर प्लॉकिंग तथा मेड़ बनाना)	4,300.00
2. निवेश लागत (बीज, खाद, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी)	10,300.00
3. फसल तथा खेत प्रबंधन (होइंग, निराई, मिट्टी चढ़ाना, सिंचाई, खाद, कीटनाशी, देखभाल करना इत्यादि।)	12,000.00
4. डिटेसिलिंग तथा रोगिंग	1,300.00
5. तुड़ाई (हार्वेस्टिंग)	2,000.00
6. सुखाना तथा भुट्टे की छंटाई	550.00
7. बाजों को सुखाना तथा शेलिंग (बीज निकालना)	1,700.00
8. भूमि लगान (लैंड रेंट) 6 माह के लिए	22,000.00
कुल	54,150.00
बीज उपज 1.5 से 2 टन/ प्रति हे०	
एफ 1 बीज की लागत = 60 रु०/- कि.ग्रा.	
सकल आय = 90000/- रु० से 120000/- रु०	
प्रति किलो बीज की लागत*	27.08 रु० से 36.10 रु० प्रति कि.ग्रा

*इस लागत में प्रसंस्करण, पैकेजिंग, यातायात इत्यादि सम्मिलित नहीं हैं।



चित्र 41. बीज उत्पादन के कुल लागत में विभिन्न प्रक्रियाओं का अंश

बीज उत्पादन में कुल लागत का प्रमुख अंश भूमि का लगान है तथा इसके पश्चात क्रमशः फसल तथा खेत प्रबंधन प्रक्रियाओं की लागत तथा निवेश लागत आती है।

अनुसूची : भारत में 1993 से 2011 के दौरान सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्के की विकसित एवं विमोचित किस्में

क्र. सं.	नाम	वंशावली	केन्द्र	विमोचन वर्ष	संस्तुत क्षेत्र	लक्षण
1.	डी एच एम 119	बी एम एल 2 x बी एम एल 15	अंगराड हैदराबाद	2011	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक	मध्यम, पीला, फिल्ट, पोषण के लिए संवेदनशील एवं झुकाव प्रतिरोधी, औसत उपज 70 कि.ग./हे.
2	पी एम एच 4	एल एम 5 x एल एम 16	पी ए यू लुधियाना	2011	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का तराई क्षेत्र	मध्यम, पीला-नारंगी, फिल्ट, पोषण के लिए संवेदनशील एवं झुकाव प्रतिरोधी
3	पी एम एच 5	एल एम 16 x एल एम 18	पी ए यू लुधियाना	2011	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	अगेती, नारंगी, फिल्ट, औसत उपज 60 कि.ग./हे.
4	विवेक संकर मक्का 39	वी 373 x सी एम 212	वि.प.कृ.अनु. षाला अल्मोडा	2011	उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश	अतिरिक्त अगेती, पीला, सेमी फिल्ट, औसत उपज 71 कि.ग./हे.
5	विवेक संकर मक्का 43	वी 373 x वी 341	वि.प.कृ.अनु. षाला अल्मोडा	2011	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एवं मध्य प्रदेश	अतिरिक्त अगेती, पीला, सेमी फिल्ट, औसत उपज 48 कि.ग./हे.
6	के एम एच 22168	जी पी एम 456 x जी पी एम 342	एम पी के वी कोल्हापुर	2011	महाराष्ट्र	पछेली, पीला, फिल्ट, औसत उपज 65 कि.ग./हे.

7	डी एच एम 111	बी एम एल 6 x बी एम एल 15	अंगराउ हैदराबाद	2010	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम, पीला, सेमी डेन्ट, पोषण के लिए संवेदनशील, झुकाव प्रतिरोधी एवं कटाई के समय हरा पौधा, औसत उपज 65 कि०/हे०।
8	डी एच एम 113	बी एम एल 2 x बी एम एल 7	अंगराउ हैदराबाद	2010	आन्ध्र प्रदेश	पछेती, नारंगी, सेमी डेन्ट, पोषण के लिए संवेदनशील एवं झुकाव प्रतिरोधी औसत उपज 66 कि०/हे०।
9	डी एच एम 117	बी एम एल 6 x बी एम एल 7	अंगराउ हैदराबाद	2010	आन्ध्र प्रदेश एवं बिहार	मध्यम, नारंगी-पीला, फ्लैट, पोषण के लिए संवेदनशील एवं झुकाव प्रतिरोधी, स्टे ग्रीन, औसत उपज 75 कि०/हे०।
10	एच एम 11	एच के आई 1128 x एच के आई 163	चौ.च.सिंह ह.कृ. वि.वि. करनाल	2009	पूरे देश के लिए सिर्फ हिमालय क्षेत्र (रबी) को छोड़कर	पछेती, नारंगी, फ्लैट, उच्च उर्वरक क्षमता के प्रति संवेदनशील औसत उपज 55 कि०/हे०।
11	एन ए एच 2049	एस के बी 50 x एन ए आई 105	नॉगनहेल्ली	2009	कर्नाटक (खरीफ एवं रबी)	पछेती, पीला-नारंगी, सेमी डेन्ट, लाजिंग प्रतिरोधी, औसत उपज 80 कि०/हे०।
12.	एच एम 10	एच के आई 193-2 x एच के आई 1128	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2008	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक	मध्यम परिपक्वता, पीला, सेमी फ्लैट, एम एल बी प्रतिरोधी, इनपुट के प्रति अति सकारात्मक, औसत उपज 72 कि०/हे०।
13.	पी एम एच 3	एल एम 17x एल एम 14	पं.कृ.वि. लुधियाना	2008	दिल्ली, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	पछेती परिपक्वता, नारंगी, फ्लैट, इनपुट के प्रति अति सकारात्मक, औसत उपज 75 कि०/हे०।

14.	निथ्याश्री	एस के वी-50 x एम ए आई-105	नौगनहेल्ली	2008	कर्नाटक (खरीफ एवं रबी)	पछेती परिपक्वता, पीला-नारंगी, सेमीडेंट, लाजिंग प्रतिरोधी, औसत उपज 80-90 क्वि०/हे०।
15.	विवेक संकर मक्का 33	वी 372 x सी एम 212	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2008	जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखण्ड	अगेती परिपक्वता, पीला, डेंट
16.	विवेक संकर मक्का 23	वी 351 x बी 341	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2007	उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र	अगेती, लम्बा फिल्ट, पीला, मोटा, टी एल बी के प्रति मध्यम सहनशील, औसत उपज 45-50 क्वि०/हे०।
17.	मक्का पी ए यू 352	एल एम 15 x सी एम एल 32	पं.कृ.वि. लुधियाना	2007	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली	अगेती, एम एल बी, बी एस डी एम, ई एस आर के प्रतिरोधी, औसत उपज 35-48 क्वि०/हे०।
18.	एच एम 8	एच के आई 1105 x एच के आई 161	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2007	महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक	नारंगी, फिल्ट, मध्यम परिपक्वता, औसत उपज 60 क्वि०/हे०।
19.	एच एम 9	एच के आई 1105 x एच के आई 1128	चौ च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2007	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश	नारंगी, फिल्ट, मध्यम परिपक्वता, औसत उपज 60 क्वि०/हे०।
20.	मालवीय संकर मक्का 2	एच यू जेड एम 185 x एच के आई 1105	ब.हि.वि.वि. वाराणसी	2007	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा	मध्यम, सेमी फिल्ट, पीला, एम एल बी प्रतिरोधी, उच्च उर्वरक क्षमता संवेदनशील, औसत उपज 54 क्वि०/ हे०।

21.	सी ओ एच (एम) 5	यू एम आई 285 x यू एम आई 61	त.कृ.वि., कोयम्बटूर	2007	तमिलनाडु	पछेती परिपक्वता, डी एम प्रतिरोधी, तनाभेदक, मध्यम सहनशील, सेमी फ्लिंट, औसत उपज 42-55 कि०/हे०।
22.	पी एम एच 1	एल एम 13 x एल एम 14	पं.कृ.वि. लुधियाना	2007	पंजाब का सिंचित क्षेत्र	पछेती परिपक्वता, टेढ़े-मेढ़े तने वाली, एम एल बी तना गलन के प्रतिरोधी, औसत उपज 52 कि०/ हे०।
23.	विवेक संकर मक्का 21	सी एम 212 x बी 341	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2007	उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक	अतिरिक्त अगेती, सेमी फ्लिंट, पीला मोटा दान, टी एल बी प्रतिरोधी, औसत उपज 40-50 कि०/हे०।
24.	विवेक संकर मक्का 25	बी 341 x बी 346	वि.प.कृ.अ.शाला अल्मोड़ा	2007	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर- पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र	अतिरिक्त अगेती, मोटा, पीला, सेमीडेन्ट, टीएलबी के प्रति सहनशील, औसत उपज 50-55 कि०/हे०।
25.	विवेक संकर मक्का 27	बी 335 x बी 345	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2007	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पं. बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	अतिरिक्त अगेती, पीला, सेमी डेन्ट, औसत उपज 50-55 कि०/हे०।
26.	पीएमएच 2	एम एम 15 x एल एम 16	पं.कृ.वि. लुधियाना	2006	दिल्ली, हरियाणा, केन्द्रीय एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश	अगेती अल्पकालिक, एम एल बी, बी एस डी एम एवं पी एफ एस आर प्रतिरोधी।

27.	बुलन्द	सी एम 146 x सी एम 147	पं.कृ.वि.वि. लुधियाना	2006	पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र	पछेती परिपक्वता, टी एल बी, कामन किट्ट (रस्ट) रोग प्रतिरोधी, औसत उपज 85 क्वि०/हे०।
28.	एच एम 5	एच के आई 1344 x एच के आई 1348	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2005	हरियाणा (खरीफ एवं रबी में)	मध्यम लंबाई, सफेद डेन्ट, मध्यम परिपक्वता, उच्च उर्वरक खुराक क्षमता वाली, पाला सहनशील, औसत उपज 68-72 क्वि०/हे०।
29.	विवेक संकर मक्का 15	सी एम 152 x सी एम 212	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2005	जम्मू-कश्मीर (हिमालयन क्षेत्र), महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु।	अतिरिक्त अगेती, टीएलबी के प्रति मध्यम सहनशील, औसत उपज 45-50 क्वि०/हे०।
30.	विवेक संकर मक्का 17	सी एम 153 x सी एम 212	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2005	पूरे देश के लिए पर्वतीय प्रान्तों को छोड़कर	अतिरिक्त अगेती, टी एल बी, एम एल बी के प्रति मध्यम सहनशील, औसत उपज 40-45 क्वि०/हे०।
31.	पूसा अतिरिक्त अगेती संकर मक्का 5	सी एम 150 x सी एम 151	भा.कृ.अनु.सं., दिल्ली	2004	जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र	अतिरिक्त अगेती परिपक्वता, टी एल बी, एम एल बी, इ एस आर सहनशील, औसत उपज 45-50 क्वि०/हे०
32.	प्रताप संकर मक्का 1	ई आई 116 x ई आई 364	म.प्र.कृ. एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	2004	राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश	अतिरिक्त अगेती परिपक्वता, सफेद, सेमी फ्लिंट, काइलो पारटेलस के प्रति मध्यम अवरोधी, औसत उपज 38 क्वि०/हे०।
33.	डी एम एच 2	सी 14 x के डी एम आई 10	यूएएस, धारवाड़	2002	कर्नाटक	पछेती, लम्बा, सेमी फ्लिंट, पीला, एस डी एम प्रतिरोधी।

34.	विवेक संकर मक्का 9	सी एम 214 x टी एल बी, सी एम 145	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2001	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु	अतिरिक्त अगेती, एम एल बी के प्रति सहनशील, औसत उपज 45-50 कि०/हे०।
35.	विवेक संकर मक्का 5	सी एम 212 x बी25	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2001	उत्तर प्रदेश (बारांसी दशा में)	अतिरिक्त अगेती, मोटा, लीफ हलाइट एवं तना भेदक सहनशील, पीला, सेमी फ्लैट, औसत उपज 45-50 कि०/हे०।
36.	पूसा अगेती संकर 3	सी एम 213 x सी एम 142	दिल्ली	2001	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली	अगेती, पीला, फ्लैट, मोटा, उच्च ताम सहनशील, औसत उपज 40-55 कि०/हे०।
37	जे एच 3459	सी एम 143 x सी एम 144	पं.कृ.वि.वि. लुधियाना	2001	पंजाब	अगेती, नारंगी, फ्लैट, औसत उपज 35-40 कि०/हे०।
38.	शीतल	एल एम 9 x एल एम 10	पं.कृ.वि.वि. लुधियाना	2001	पंजाब (रबी)	पछेती परिपक्वता।
39.	एच एच एम 1	एच के आई 536 x एच के आई 295	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2000	हरियाणा	मध्यम, एम एल बी, सामान्य किट्ट प्रतिरोधी, सर्दी के मौसम में मुख्य कीट, पाला एवं ठंडी के प्रति सहनशील, औसत उपज 50-60 कि०/हे०।
40.	एच एच एम 2 (एकल संकर)	एच के आई 1352 x एच के आई 1344	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2000	हरियाणा प्रान्त के रबी एवं खरीफ के सिंचित दशा में।	पछेती, लम्बा, खरीफ ऋतु में एम एल बी तथा रबी में सामान्य किट्ट के प्रतिरोधी, मुख्य कीट सहनशील, उर्वरक क्षमता युक्त, औसत उपज 50-60 कि०/हे०।

41.	विवेक संकर मक्का 4	सी एम 212 x सी एम 141	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	1999	गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश	अतिरिक्त अगेती, टी एल बी, एम एल बी के प्रति सहनशील, औसत उपज 45-50 क्वि/हे०।
42.	पूसा अगेती संकर मक्का 1	सी एम 135 x सी एम 136	दिल्ली	1997	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक	अगेती, एम एल बी, रा. सोलानाई के प्रतिरोधी, काईलो पार्टीलस, जल झुकाव, (वाटर लाजिंग) के प्रति उच्च प्रतिरोधी औसत उपज 45 क्वि/हे०।
43.	पूसा अगेती संकर मक्का 2	सी एम 136 x सी एम 138	दिल्ली	1997	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश	अगेती, फ्लिंट, नारंगी, मोटा, नमी स्ट्रेस सहनशील, औसत उपज 30-50 क्वि/हे०।
44.	प्रकाश	सी एम 139 x सी एम 140	पं.कृ.वि.वि. लुधियाना	1997	सम्पूर्ण भारत	अगेती, फ्लिंट, लाजिंग, सैटेसिंग, एम एल बी, बी एस डी एम प्रतिरोधी।
45.	सीओएच 2	यू एम आई 810 x यू एम आई 90	त.कृ.वि.वि. कोयम्बटूर	1993	तमिलनाडु	
क्यू पी एम						
1.	एच क्यू पी एम 4	एच के आई 193- 2 x एच के आई 161	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2008	पूरे देश भर में सिर्फ हिमालय क्षेत्र को छोड़कर	पछेती, पीला, सेमी फ्लिंट, पोषण के प्रति संवर्धनशील, एम एल बी और पी एफ एस आर के लिए प्रतिरोधी, औसत उपज 60 क्वि/हे०।
2.	एच क्यू पी एम 7	एच के आई 193-1 x एच के आई 161	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2008	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र	पीला-नारंगी, पछेती, मजबूत पौधा।

3.	विवेक क्यू पी एम 9	वी क्यू एल 1 x वी क्यू एल 2	वि.प.कृ.अ. शाला अल्मोड़ा	2008	जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र	अतिरिक्त अगोती, दाने का रंग एवं प्रकार पीला, डेन्ट, कम नाईट्रोजन उपलब्धता में अच्छा प्रदर्शन, औसत उपज 52-58 कि०/हे०।
4.	एच क्यू पी एम 5	एच के आई 163 x एच के आई 161	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2007	पूरे देश हेतु	क्यू पी एम संकर, नारंगी, फ्लैट दाना, पछेती, एम एल बी और काइलो पारटिलिस प्रतिरोधी, उच्च उर्वरक क्षमता वाली, औसत उपज 58 कि०/हे०।
5.	शक्तिमान 3	सी एम एल 161 x सी एम एल 163	रा.कृ.वि.वि. ढोली	2006	बिहार	पछेती, लम्बा, क्यू पी एम संकर, (प्रोटीन में 0.73 प्रतिशत ट्रिप्टोफेन), सेमी फ्लैट, नारंगी-पीला, एम एल बी, एल एस एम के प्रति सहनशील।
6.	शक्तिमान 4	सी एम एल 161 x सी एम एल 169	रा.कृ.वि.वि. ढोली	2006	बिहार	क्यू पी एम संकर (प्रोटीन में 0.93 प्रतिशत ट्रिप्टोफेन), सेमी फ्लैट, एम एल बी प्रतिरोधी।
7.	एच क्यू पी एम 1	एच के आई 193-1 x एच के आई 163	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2005	पूरे देश हेतु	पीला, डेन्ट, पछेती परिपक्वता, उच्च उर्वरक खुराक क्षमता वाली, पाला/सर्दी सहनशील, एम एल बी और सामान्य किट्ट प्रतिरोधी, औसत उपज 62 कि०/हे०।
8.	शक्तिमान 2	सी एम एल 176 x सी एम एल 186	रा.कृ.वि.वि. ढोली	2006	बिहार	पछेती, लम्बा, एम एल बी प्रतिरोधी, क्यू पी एम (प्रोटीन में 1.04 प्रतिशत ट्रिप्टोफेन)

बेबीकॉर्न						
1.	एच एम 4	एच के आई 1105 x एच के आई 323	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2005	पूरे देश के लिए	बेबीकॉर्न, नारंगी, फ्लैट मध्यम ऊँचाई वाला, मध्यम परिपक्वता, सदी एवं पाला के प्रतिरोधी, औसत उपज 60-68 क्वि०/हे०।
स्वीट कॉर्न						
1.	एच एच सी 1	एच के आई 1831 x एच के आई एस सी एस टी-1	चौ.च.सि.ह.कृ.वि. करनाल	2010	हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड	मध्यम, हल्का पीला, सेमी-डेंट, पोषण के लिए प्रतिरोधी, एम एल बी (खरीफ) के लिए प्रतिरोधी, औसत उपज 120 क्वि०/हे० (हरा भूट्टा)



मक्का अनुसंधान निदेशालय

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

पुसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012 (भारत)

ईमेल: pdmaize@gmail.com; dirdmr@icar.org.in

वेबसाइट: www.maizeindia.org

फोन: 011-25841805, 25842372

फैक्स: 011-25848195